

A Headland termékkínálata

Zintula 700

a láthatóan meghálált cink

Összetétel: Zn 700 g/l

Talajtani szakirodalmak szerint Magyarország talajainak közel **50%-a** közepes vagy gyenge „Zn” ellátottságú. Ez minden termelőt megfontolásra kell készítsen, különösen azért, mert a „Zn” hiánya következtében a termésveszteség jelentős mérvű is lehet!

Cinkhiány esetén a kukorica növekedése visszafogottá válik. Hiány tünetei, amikor a leveleken fehéres halványsárga csíkok keletkeznek. Kezdeti tünetek kezelésére javasoljuk a **Zintula 700**-as készítményt, amit láthatóan meghálál a kukorica.



Növény	Dózis kg/ha	Víz l/ha	Időzítés
Kukorica	1	200-300	3-6 leveles állapottól címerhányásig
Gabona félek	1	200-300	őszi bokrosodáskor, tavasszal a 2. nódusznál
Cukorrépa	1	200-300	4-6 leveles állapottól
Repce	0,5-1	200-300	ősszel 4-8 leveles, tavasszal szárbá induláskor
Napraforgó	1	200-300	6-8 leveles, ill. csillagbimbós állapotáig
Lucerna	0,5-1	200-300	8-10 cm-es hajtáshossznál
Zöldségfélék	0,5-1	200-300	4-6 leveles állapottól
Hagyma	1	200-300	3-4 leveles állapottól
Bab, borsó	1	200-300	4-6 leveles állapottól
Burgonya	0,5-1	200-300	1 héttel a teljes sorolás után
Szőlő	1	500	hajtásnövekedés idején
Gyümölcs	1	500	sziromhullás után